

# Naistenklinikalla synnyttäneellä todettu tuberkuloositartunta – useat vastasyntyneet saattaneet altistua



Synnytyssali Naistenklinikalla Helsingissä. (KUVA: Emmi Korhonen / Lehtikuva)

Ilta-Sanomat, julkaistu: 13.3.2019 12:10

## Naistenklinikan tietoon on tullut tartuttavaa tuberkuloosia sairastava, klinikalla kuun vaihteessa synnyttänyt henkilö.

Helsingin Naistenklinikalla on hiljattain synnyttänyt tuberkuloosia sairastava henkilö.

Ilta-Sanomien tietojen mukaan ainakin osalle helmi-maaliskuun vaihteessa Naistenklinikalla synnyttäneille tai siellä oleskelleille perheille on ilmoitettu tuberkuloosin tartuntariskistä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan tuberkuloositartunnalle on saattanut altistua ainakin Naistenklinikan osastolla 61.

Klinikalla tuolloin vierailleita perheitä on pyydetty aloittamaan vastasyntyneille lapsille kolmen kuukauden mittainen tuberkuloosilääkitys. Vastasyntyneille ei ole olemassa valmista tuberkuloosilääkettä, mutta sitä valmistetaan erikseen tartunnalle altistuneille lapsille. Perheiden pitää kolmen kuukauden ajan noutaa lääkemuksia tietyissä erissä.

– Tietoomme on tullut tartuttavaa tuberkuloosia sairastava, hiljattain synnyttänyt henkilö. Heti, kun tällainen tieto on tullut meille, olemme ryhtyneet normaaliohjeistuksen mukaisesti

kartoitustoimiin ja tartuntatoimiin. Tällä hetkellä meillä on selvitykset käynnissä, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) infektiosairauksien erikoislääkäri [Sanna Isosomppi](#) kertoo Ilta-Sanomille.

Tapauksesta selviää lisää myöhemmin. Asian tiimoilta pidetään tänään kokous.

Tuberkuloosi on infektiotauti, joka yleisimmin ilmenee keuhkoissa. Tuberkuloosi tarttuu ilmassa olevien pienten pisaroiden välityksellä. Se on maailmanlaajuisesti yksi kansanterveydellisesti ja kansantaloudellisesti merkittävimmistä sairauksista.

Suomessa tuberkuloosi on harvinainen, ja siihen sairastuvat kantasuomalaisista pääasiassa iäkkäät henkilöt.

*Juttua korjattu 13.3. klo 14.03. Tuberkuloositartunnalle on saattanut altistua osastolla 61. Ei osastolla 6, kuten virheellisesti kerrottiin.*

[Nelli Lapintie](#)

Linkki jutun IS-sivulle: <https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006033446.html?cs=email>

---

# Naistenklinikan tuberkuloositartunnalle altistui 15 vastasyntynyttä



Ilta-Sanomat: Julkaistu: 13.3.2019, 15:00

## Altistusaika on jäänyt kaikilta lyhyeksi.

**Ilta-Sanomat** kertoi tänään, että Helsingin Naistenlinikalla on hiljattain synnyttänyt tuberkuloosia sairastava henkilö.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) vahvistaa, että tuberkuloosin tartuntariski koskee 27. helmikuuta–7. maaliskuuta välisenä aikana Naistenklinikan synnyttäneiden osasto 61:llä ja vastasyntyneiden teho-osastolla olleita henkilöitä.

Altistusaika on jäänyt kaikilta lyhyeksi, mutta HUS on 15:een perheeseen yhteydessä. HUS:n mukaan valtaosa perheistä on jo tavoitettu.

HUS arvioi riskin tuberkuloosin saamiseksi kaikkien osalta vähäiseksi.

– Olemme tarkkoja, kun on kyse vastasyntyneiden osastosta. Silloin reagoidaan hyvin herkästi, kuten tässäkin tapauksessa on tehty. Ehkä jopa vähän yliherkästi, infektiosairauksien klinikan ylilääkäri [Asko Järvinen](#) kertoo Ilta-Sanomille.

Pisimpään altistuneita perheitä on pyydetty aloittamaan vastasyntyneille lapsille kolmen kuukauden mittainen tuberkuloosin estolääkitys. Klinikalla oleilleet aikuiset eivät joudu aloittamaan lääkitystä.

Järvinen kertoo, että tartunnalle altistuneita vastasyntyneitä lääkitään Isoniatsidilla, joka on tyypillinen lääke tuberkuloosin hoitoon. Koska vastasyntyneet lapset kasvavat nopeasti, lääkeannostuksia joudutaan valvomaan tarkasti. Järvinen ei ole itse lastenlääkäri, mutta hän arvelee, että vastasyntyneille valmistetaan tuberkuloosilääkkeestä heille sopivaa liuosta.

Perheiden pitää kolmen kuukauden ajan noutaa lääkeannoksia tietyissä erissä sairaalan apteekista.

– Tuberkuloosi on yleisvaarallinen tartuntatauti, joten yleishoito ja lääkehoito ovat ilmaisia, Järvinen sanoo.

– Aikuisille annetaan altistustapauksissa lääkettä kotiin pidemmäksikin aikaa, mutta nyt joudutaan lapsen painon mukaan seuraamaan, että pitääkö annosta muuttaa.

Yliääkärin mukaan vakavin tuberkuloosilääkkeen sivuoire voi olla maksatulehdus.

– Sen takia tämä vaatii seurantaa ja lääkettä ei kannata antaa kaikille, vaan täytyy arvioida riski. Meidän lastenlääkärimme ovat katsoneet, että lääkitys annetaan pienenkin riskin vähentämiseksi, sillä lapsilla tuberkuloosi voi edetä nopeammin ja olla vaikea tauti.

HUS:n mukaan muita mahdollisesti altistuneita henkilöitä kartoitetaan kansallisten ohjeiden mukaisesti. Tartuntariskin rajana pidetään 40 tunnin altistusaikaa potilaan kanssa samassa huoneessa. Kaikkiin tällä tavoin altistuneisiin henkilöihin ollaan myös yhteydessä jatkotoimenpiteiden suhteen.

Tuberkuloosi on infektio tauti, joka yleisimmin ilmenee keuhkoissa. Tuberkuloosi tarttuu ilmassa olevien pienten pisaroiden välityksellä. Tartuntariskin suuruuteen vaikuttavat useat eri asiat, joista merkittävimpiä ovat kontaktin läheisyys ja altistusaika.

Noin kolmasosa altistuneista saa tartunnan ja heistä noin kymmenesosa saa taudin oireita.

[Nelli Lapintie](#)

Linkki jutun IS-sivulle: <https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006033729.html>

---